



INDIKATIONEN

- › V. a. Meningitis
- › Encephalitis

MATERIALGEWINNUNG

- › **ACHTUNG** Bitte noch vor der Punktion den Transport der Probe organisieren und das Labor informieren
- › Liquorentnahme möglichst vor Beginn der Antibiotikatherapie vornehmen

Hautdesinfektion des Patienten

Entscheidend ist eine sorgfältige Hautdesinfektion, um Kontaminationen zu vermeiden:

- › Punktionsstelle mit sterilem Tupfer mit 70%igem Propanol oder Ethanol desinfizieren, Haut trocknen lassen
- › 2. Desinfektion mit sterilem Tupfer mit 70%igem Alkohol oder 1-2%iger Jodtinktur, Haut trocknen lassen

Liquorentnahme unter streng aseptischen Bedingungen

- › Punktion zur Gewinnung von 5–10 ml Liquor
- › Unter streng aseptischen Bedingungen in 2–3 sterile Probenröhrchen abtropfen lassen, alternativ ca. 2–5 ml in eine Blutkulturflasche geben

HINWEISE

- › Bei Verdacht auf eine Sepsis sollten zusätzlich Blutkulturen entnommen werden (siehe „Blutkulturen“)

LAGERUNG

- › Gefäße ohne Bouillon im Kühlschrank (bei 4–8°C)
- › Gefäße mit Nährbouillon bei Raumtemperatur