

URETHRALABSTRICH EJAKULAT | PROSTATASEKRET



INDIKATIONEN

Urethralabstrich

- › Urethritis
- › Epididymitis
- › Verdacht auf STD
- › V.a. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis

Ejakulat

- › chronische Prostatitis
- › Epididymitis
- › Diagnostik bei männlicher Infertilität

Prostatasekret

- › Akute Prostatitis

MATERIALGEWINNUNG

Urethralabstrich

- › Abnahme morgens noch vor der ersten Miktion oder 2–3 Stunden nach der letzten Miktion
- › ♂ nach vorsichtiger Reinigung der Harnröhrenmündung, Harnröhre von hinten nach vorn austreichen und austretendes Sekret mit Abstrichtupfer aufnehmen, falls so kein Sekret gewonnen werden kann, dünnen Tupfer vorsichtig ca. 2 cm in die Urethra schieben und leicht drehen
- › ♀ nach Reinigung der Harnröhrenmündung Material aus ca. 2 cm Tiefe gewinnen

Ejakulat

- › Bereich um die Harnröhrenmündung mit Wasser/Seife reinigen, gut abspülen und mit sterilem Tupfer trocknen
- › Ejakulat in sterilem Gefäß auffangen und möglichst schnell ins Labor schicken

Prostatasekret

Akute bakterielle Prostatitis

- › Bei der schweren Form bitte kein Prostatasekret (Kontraindikation) gewinnen, sondern Mittelstrahlurin (siehe Materialgewinnung Urin)

Chronische bakterielle Prostatitis

- › Untersuchungsproben umfassen Urethralabstriche/Urethrasekret, Erst- und Mittelstrahlurin, Prostatasekret und Exprimaturin
- › Nach der Reinigung der Harnröhrenmündung mit Wasser und Seife wird die Prostata vom Rektum aus massiert und das ausfließende Exprimat in einem sterilen Gefäß aufgefangen (Bei geringen Mengen Abstrichtupfer verwenden)

URETHRALABSTRICH EJAKULAT | PROSTATASEKRET



SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

Folgende Anforderungen/Diagnosen oder Verdachtsfälle bitte extra vermerken

- › *Chlamydia trachomatis* › PCR aus Abstrichmaterial od. Erststrahlurin (Morgenurin)
- › *Neisseria gonorrhoeae*
- › *Treponema pallidum* › PCR aus Abstrichmaterial
- › *Haemophilus ducreyi*

LAGERUNG

- › bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)




für Ejakulat/Prostatasekret



für Urethralabstrich



für Urethralabstrich



für Morgenurin